

QUE ES LA APENDICITIS AGUDA

El apéndice es un órgano pequeño en forma de dedo que se extiende desde la primera parte del intestino grueso. Cuando se inflama o se infecta, la afección se denomina apendicitis.



Cuando tiene apendicitis aguda, su apéndice debe ser removido de emergencia. Un apéndice con un agujero puede filtrar e infectar toda el área abdominal y es a lo que llamamos peritonitis. Esto puede ser mortal.



Es reconocida como una de las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo o repentino en el mundo y aproximadamente el 7% de la población será operado de una apendicetomía debida a una apendicitis aguda.


El diagnóstico de la apendicitis se basa en la exploración física y otras pruebas como la ecografía abdominal y radiografías.



Los 10 signos y síntomas de apendicitis más comunes son los siguientes:

- Dolor abdominal.
- Rigidez de la pared del abdomen.
- Mareos.
- Vómitos.
- Pérdida del apetito.
- Fiebre.
- Diarrea
- Estreñimiento.
- Distensión abdominal.
- Leucocitosis (aumento del número de leucocitos en el hemograma).

La apendicitis es causa común de cirugías de emergencia. Se genera cuando el apéndice se bloquea por heces, cuerpos extraños o en raras ocasiones por un tumor.



El primer síntoma suele ser un leve dolor alrededor del ombligo, pero se vuelve más agudo y grave. También se presentan, náuseas, vómitos y fiebre baja.

El tratamiento casi siempre implica la extirpación del apéndice. Cualquier persona puede padecer de apendicitis pero se presenta con mayor frecuencia en las personas de entre 10 y 30 años.

La apendicetomía es una técnica quirúrgica por medio de la cual se extrae el apéndice, especialmente en casos de apendicitis aguda. Este procedimiento puede realizarse "abierto, convencional" (se accede a la cavidad abdominal a través de la clásica incisión o herida) o por una vía "laparoscópica, mínimamente invasiva". En [Sonodigest](#) Centro de cirugía ambulatoria contamos con los mejores procedimientos para ti.